

San Mateo County Behavioral Health and Recovery Services  
Información al cliente acerca de NALTREXONA INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA  
(Vivitrol)

**¿Para qué sirve este medicamento?**

- La naltrexona inyectable de acción prolongada se usa para reducir las ganas de tomar, los días de consumo de alcohol y la ingestión de alcohol en general.
- Sirve para tratar la dependencia del alcohol y de los opioides (por ejemplo, heroína, oxycodone, Norco, Percocet, y Vicodin) solo cuando se usa como parte de un programa de tratamiento que incluye orientación y apoyo.

**Efectos secundarios:**

- Náuseas: usualmente son leves y mejoran en unos días después de la primera inyección. Es poco probable que las náuseas se vuelvan a presentar después de más inyecciones.
- Cansancio, dolor de cabeza, disminución del apetito, dolor en las articulaciones y calambres musculares.
- Mareo: evite conducir u operar maquinaria pesada hasta que haya determinado cómo le afecta la naltrexona inyectable de acción prolongada.
- Reacción en la parte del cuerpo donde se pone la inyección: puede incluir dolor, sensibilidad, inflamación, hinchazón, enrojecimiento, moretones o comezón.

**Otros posibles efectos secundarios:**

Daño hepático: la naltrexona puede causar daño en el hígado en personas que ya tienen daño hepático causado por otras enfermedades. Avise a su médico si usted presenta los siguientes síntomas de problemas hepáticos:

- Dolor en el área estomacal durante más de unos cuantos días.
- Color amarillento en la parte blanca de los ojos, orina oscura.
- Fatiga.

Estado de ánimo depresivo: Informe a sus familiares y a personas cercanas a usted que está recibiendo naltrexona inyectable de acción prolongada. Usted o aquellas personas cercanas a usted deben llamar a su médico de inmediato si experimenta síntomas de depresión.

Neumonía alérgica: Avise a su médico si tiene dificultad para respirar, respiración silbante o tos persistente.

Reacciones severas a la inyección: la naltrexona inyectable de acción prolongada puede causar severas reacciones en la parte inyectada que puede incluir hasta la muerte del tejido. Avise a su médico de inmediato si en el área de la inyección nota alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor intenso, hinchazón, bultos, o si el área se siente endurecida.
- Ampollas, una herida abierta, una costra oscura.

Consulte a su médico sobre cualquier reacción en la parte inyectada que le preocupe, que empeore con el tiempo o no mejore después de dos semanas de haber recibido la inyección. La inyección le debe ser

administrada por un profesional de la salud calificado para aplicar la inyección.

Acciones alérgicas severas: Busque ayuda médica inmediata si usted tiene salpullido; inflamación del rostro, ojos, boca o lengua; dificultad para respirar o respiración silbante; dolor en el pecho o si se siente mareado o se va a desmayar.

**Abstinencia súbita de opiodes:**

- Para evitar la abstinencia de opiodes, debe dejar de consumir cualquier medicamento que contenga opiodes (incluyendo metadona o buprenorfina) **al menos de 7 a 14 días** antes de comenzar con naltrexona inyectable de acción prolongada.
- No se aplique naltrexona inyectable de acción prolongada si usted presenta síntomas de abstinencia a los opiodes.
- Avise a su médico sobre cualquier uso reciente de opiodes o cualquier historial de dependencia de los opiodes antes de comenzar un tratamiento con naltrexona inyectable de acción prolongada. La abstinencia súbita de opiodes puede ser severa y puede requerir hospitalización.

**Riesgo de sobredosis de opiodes:**

Si ha consumido opiodes con anterioridad, usted puede ser más sensible a menores cantidades de opiodes después de la desintoxicación, después de que el tratamiento con naltrexona se ha suspendido, después de no tomar una dosis, o cerca de la siguiente dosis.

- Informe a sus familiares y a la gente cercana a usted de este incremento de sensibilidad a los opiáceos y del riesgo de sobredosis.
- Consumir grandes cantidades de heroína o de cualquier otro opioide para superar los efectos de bloqueos opiodes mientras consume naltrexona inyectable de acción prolongada, puede causar una lesión severa, el coma o la muerte.
- Consiga atención médica inmediatamente si tiene dificultad al respirar, se siente adormilado con respiración lenta, siente que se va a desmayar, se marea, se siente confundido o tiene cualquier otro síntoma inusual.

**Otra información importante acerca de la naltrexona inyectable de acción prolongada:**

Ya que la naltrexona inyectable de acción prolongada puede bloquear los efectos de los opiodes, usted no sentirá ningún efecto si consume heroína o cualquier otro opioide en pequeñas cantidades mientras se administre la naltrexona inyectable de acción prolongada. También, es posible que no sienta los mismos efectos si toma analgésicos que contengan opiodes, antidiarreicos o medicamentos contra la tos.

Para asegurarse de obtener tratamiento médico adecuado en una emergencia, debe llevar consigo la documentación que alerte a su proveedor de atención médica acerca de su tratamiento con naltrexona inyectable de acción prolongada.

Ya que la naltrexona inyectable de acción prolongada es una inyección intramuscular y no es un dispositivo implantado, una vez que el medicamento es inyectado, no es posible retirarlo del cuerpo.

**Avise a su médico si:**

- Se embaraza, tiene intenciones de embarazarse o está en período de lactancia durante su tratamiento con naltrexona inyectable de acción prolongada.
- Experimenta síntomas respiratorios como dificultad para respirar, tos o respiración silbante.
- Experimenta cualquier reacción alérgica, síntomas inusuales o efectos secundarios importantes mientras se administra naltrexona inyectable de acción prolongada.

